

Sopra alcuni Dermatteri del Museo Civico di Genova

Nota di MALCOLM BURR, Eastry, (Kent.)

Mi è grato porgere i miei vivi ringraziamenti alla direzione del Museo Civico di Genova, che gentilmente volle affidarmi i numerosi tipi di de Bormans, per facilitare il mio lavoro sopra i Dermatteri e, nello stesso tempo, lo studio di esemplari non ancora determinati che si trovano nel Museo. Fra questi vi sono parecchie *Anisolabis* di diverse località ma tutte di sesso femminile; perciò non determinabili con esattezza.

Echinosoma, Serv.

1. *afrum*, Pal. Beauv.

Congo: Barobiti (Ribotti, 1907, 1 ♀).

Uganda: Entebbe (C. Berti, 1907, 2 ♂).

2. *wahlbergi*, Dohrn.

Congo: Buta (Rubi) (Ribotti, VII, 1 ♀).

3. *sumatranum*, Haan.

Nuova Guinea: Ighibirei (Loria, VII, VIII, 1890, 1 ♀).

Labidura.

1. *riparia*, Pall.

Victoria Nyanza: Arcip. di Sesse, Bugala (Dott. E. Bayon, 1908). Parecchi esemplari di colore scuro.

Eritrea: Setit, El Eghin, II, 1906 (Dott. Figini).

Somalia: da Bohotle a Berbera, V, VII, 1885 (Cap. C. Citerni). Benadir, Mogadiscio, VI, VII, 1908 (Ten. A. Pantano).

Somalia: (Mancini, 1 ♂).

Egitto: Suez, Cairo, 1880, (Doria e Beccari).

Congo: Buta (Rubi) VII (Ribotti, 1906, 2 ♂ e 2 larve).

2. *figinii*, sp. n.

Statura minore; colore fusco, forcipis brachia ♂ valida, margine interno dente valido, acuto, laminato armata, ♂, ♀.

Long. corporis ♂ 8.5 mm., ♀ 8.5 mm.

Long. forcipis ♂ 2 mm., ♀ 3 mm.

Capo bruno-piceo, convesso, le suture non distinte, antenne brune, tipiche del genere; 3° segmento lungo, cilindrico; 4° e 5° molto più corti, 6° un poco più corto del 5°; gli altri segmenti eguali al terzo.

Pronoto un poco più lungo che largo, ed un poco più largo posteriormente che anteriormente, piano, cogli angoli posteriori arrotondati, bruno-oscuro.

Elitri corti, quadrangolari, tronchi, carenati, ali deficienti.

Zampe bruno-giallo, coi femori oscurati.

Addome parallelo, bruno-nero.

Segmento ultimo dorsale del ♂ liscio, lucente, grande, trasverso, con una fossetta mediana, il margine posteriore troncato, fornito di due tubercoli ottusi in corrispondenza dei rami della pinzetta; nella ♀ più stretto e privo di tubercoli.

Rami della pinzetta nel ♂ robusti, triquetri, debolmente depressi, poco distanti fra loro, quasi dritti, forniti al margine interno nel primo terzo della loro lunghezza di una sporgenza piana, larga, robusta ed acuta, a mo' di dente, rivolta verso l'estremità della pinzetta, dopo la quale esse

vanno assottigliandosi e leggermente incurvandosi; nella ♀ i rami sono robusti, contigui, triquetri e quasi dritti, conici.

Eritrea: Setit El Eghin, II, 1906, 1 ♂, 1 ♀ (Dott. Figini).

Questa specie è vicina alla *Labidura lividipes*, Duf. ed alla *L. tenuicornis*, Borm., ma ne differisce per la forma della pinzetta che rassomiglia alquanto a quella della *L. nepalensis*, Burr.; questa ha il margine interno della pinzetta fortemente depresso e laminato per un terzo della sua lunghezza, mentre la *L. figinii* ha un dente forte, robusto ed acuto.

È molto interessante a notarsi che questa specie rassomiglia assai ad una specie fossile non ancora descritta, dell'ambra oligocena di Prussia.

Psalis, Sterx.

1. *americana*, Pal. Beauv.

Colombia: Cartago (♀ Bernard, Dott. Griffini, 1 ♂, 1 ♀).

Anisolabis, Fieber.

1. *annulipes*, Luc.

Eritrea: (Dott. Figini, ♂, ♀). Adua (Cap. Tancredi, 1908, 1 ♂).

Victoria Nyanza: Arcip. di Sesse, Bugala (Dott. E. Bayon, 1908, ♂).

Argentina: Buenos Aires, Palermo (Silvestri, 3, VII, 1898, 2 ♀).

Azorre: S. Miguel (Corsaro, 1886, ♂, ♀).

Labia, Lead.

1. *minor*, L.

Victoria Nyanza: Arcip. di Sesse, Bugala, 1908 (Dott. E. Bayon) (numerosissimi esemplari, ♂ ♀ e larve).

Buenos Aires: II, 1899 (Dott. F. Silvestri, 6 ♂, 1 ♀).

2. *borellii*, sp. n.

Statura minore; fusco-castanea; antennae segmentis elongatis; elytra et alae perfecte explicatae; abdomen sat longum; segmentum ultimum dorsale ♂ margine postico spinulis 2 armatum; segmentum penultimum ventrale ♂ in spinas 2 productum; forcipis brachia ♂ gracilia, elongata, arcuata, margine interno basi dente forti armata, ♂ ♀.

Long. corporis ♂ 4.5-6 mm., ♀ 5.25 mm.

Long. forcipis ♂ 1.25-2.25 mm., ♀ 1.5 mm.

Capo nero-piceo, convesso, con suture non distinte.

Antenne di 11 segmenti, di colore bruno-grigio, più pallido all'estremità; tutti i segmenti cilindrici, lunghi, il quarto eguale al terzo.

Pronoto quadrangolare, col margine posteriore arrotondato, nero-piceo, coi margini laterali gialli oscuri e debolmente riflessi.

Elitri lunghi, di colore nero-piceo, punteggiati.

Ali lunghe, dello stesso colore.

Zampe di un giallo scuro, coi tarsi lunghi, gracili, il secondo segmento relativamente lungo.

Addome lungo, parallelo, di colore bruno-oscuro, liscio, segmento ultimo dorsale del ♂ trasverso; margine posteriore debolmente concavo fra le radici della pinzetta con un tubercolo tumido ai lati, e fornito di due punte; segmento penultimo ventrale del ♂ grande, col margine posteriore fornito di due punte ottuse, piane e fortemente divergenti; la ♀ ha una punta.

Pigidio ♂ corto, ottuso; ♀ ottuso, più distinto, col margine posteriore troncato.

Rami della pinzetta del ♂ di colore bruno-rossiccio, molto distanti fra loro e quasi diritti, lunghi e gracili, leggermente concavi e scavati alla base e forniti sui margini inferiori e superiori di un piccolo tubercolo spiniforme, poi regolarmente ma sottilissimamente denticolati; nella ♀ i

rami sono più robusti, quasi diritti, lunghi, forniti di un piccolo dente vicino alla base, e poi regolarmente denticolati per tutta la loro lunghezza.

Victoria Nyanza: Arcip. di Sesse, Bugala, 1908 (Dott. E. Bayon, 5 ♂, 3 ♀).

Questa specie è vicina alla *Labia minor* per la forma generale del corpo, della pinzetta, e per l'appendice del penultimo segmento ventrale.

Nella *L. minor*, c'è un'appendice spiniforme, mentre la *L. borellii* ha due forti sporgenze di forma caratteristica.

Mi permetto di dedicarla al mio buon amico, il chiaro entomologo Dr. A. Borelli di Torino, che ebbe la cortesia di confrontare i miei esemplari coi tipi della ricca raccolta di quel Museo.

3. *marginalis*, Thunb.

Congo: Buta (Rubi). (Ribotti, 1906, 1 ♂, 2 ♀).

4. *grandis*, Borm.

Nuova Guinea: Ighibirei (Dott. Loria, 2 ♂, 1 ♀).

Spongiphora, Serv.

1. *assiniensis*, Borm.

Victoria Nyanza: Arcip. di Sesse, Bugala, 1908 (Dott. E. Bayon, ♂, ♀).

2. ? *tripunctata*, Bor.

Congo: Ibembo (XII, 1905, Ribotti, 1 ♀).

L'esemplare, di colore oscuro, da me esaminato, potrebbe essere nuovo, ma senza il maschio non si può determinare con esattezza.

3. *punctipennis*, Stal.

Argentina: Tucuman, Tafi Viejo (Dott. Silvestri, 1 ♀).

Chelisoches, Scudd.

1. morio, Fab.

Nuova Guinea: Moroka, 1300 m. s. m. (Dott. Loria, VII, XI, 1893, 1 ♀).

Hypurgus, Burr.

1. sp.

Uganda: Entebbe (C. Berti, 1902, 1 ♀).

2. humeralis, Kirby.

Birmania: Pegu, Palon, VIII, IX, 1887 (L. Fea, 1887, 1 ♂).

Ancistrogaster, Star.

1. sp.

Bolivia: Rio Beni, La Paz Reyes (Balzan, 1891).

Un solo esemplare in cattivo stato; forse specie nuova.

Elaunon, Burr.

1. erythrocephala, Oliv.

Victoria Nyanza: Arcip. di Sesse, Bugala (1908, Dott. E. Bayon, 1 ♀).

Benadir: Mt. Kermala, XII, 1906, 1 ♀. (Ten. A. Pantano).

2. bonchampsii, Burr.

Egitto: Sul Nilo, da Chartum a Gondokoro, II, 1904, (E. d'Albertis).

Questa specie era conosciuta fino adesso soltanto da due esemplari dell'Abissinia, appartenenti al Museo di Parigi.

Gli esemplari del Museo Civico di Genova sono un poco

più piccoli, i rami della pinzetta sono assolutamente dritti fino all'estremità, come nella specie molto vicina *E. erythrocephala*; il piccolo dente del secondo terzo della lunghezza, che non esiste nell'*E. erythrocephala*, è bene sviluppato in uno di questi, però manca nell'altro.

Questa specie differisce dall'*E. erythrocephala* non soltanto pel colore pallido del capo, pronoto ed elitri, ma anche per la forma del pronoto; questo è più largo al margine posteriore che all'anteriore, mentre nell'*E. erythrocephala* è parallelo.

Doru, Burr.

1. lineare, Esch.

a) *Varietà* di statura piccola e colore pallido.

Argentina: Tucuman, Tafi Viejo, 1♂, 2♀, Santa Ana, 1♂ e San Lorenzo, 1♀ (Dott. F. Silvestri).

b) *Varietà* di colore oscuro, ali non sporgenti, ed elitri corti e molto scuri.

Argentina: Prov. Salta, La Tala, VII, 1898 (Dott. F. Silvestri).

c) *Varietà* di statura maggiore, ma gracile e stretta, di colore oscuro ed ali deficienti.

Argentina: La Tala (2♀, Dott. F. Silvestri).

Forficula, L.

1. senegalensis, Serv.

Dint. Harrar, V, VI, 1904 (Cap. Citerni ♂, ♀).
